

Støttemadning af nyfødte killinger og temperaturer

Det allervigtigste for nyfødte killinger er indenfor de første 24 timer at få Colostrum – der i den periode i højere grad er koncentreret i hunkattens mælk, men er under hele diegivningsperioden tilstede. Killingernes tarme er kun i stand til at optage antistofferne fra colostrummen de første 24 timer efter fødsel. Colostrum indeholder en masse antistoffer fra moderen der vil gøre killingen mindre modstandsdygtig for det massive pres den møder af vira og bakterier i det virkelige liv, og er et spejl af morkattens antistoffer fra hvad hun har mødt. Det kan på en måde siges killingen får en vis beskyttelse fra moderen mod hvad der er i hjemmet.

Det er ikke unormalt at mælken først kommer når alle killinger er født.

Skal der gives tilskud er det vigtigste at killingen får væske nok - mere vigtigt end der kommer mælk på den. Mange patter helt af sig selv efter at have fået et par dråber kogt afkølet druesukervand - det virker som kvikstarter.

Det frarådes de første fire uger at giver killingerne pulvermælk, killingernes tarme kan have problemer med at optage pulvermælken - dødsfald kan blive resultatet. Prøv selv at se hvad der sker med den blanding der er lavet - efter kort tid er der bundfald - trods den er rystet godt. Fungerer på samme måde i tarmen.

Gedemælk tåler så små killinger og deres tarme rigtig godt, fedtmolekyler er mindre, mere skånsomme og optages bedre. Det fås i de fleste Irma. Bør man altid have i huset når der er fødsel i vente. Det indeholder ikke alt killingen ernæringsmæssigt har brug for - men er godt på grund af den er så skånsom og kan sagtens bruges indtil man får fat i speciel flydende killingemodermælkserstatning, for eksempel KMR. Bruges gedemælken ikke til de helt små killinger kan den gives til morkatten, eller fryses i isterningsposer og blandes i vådmaden når killingerne skal til at spise fast føde.

God blanding til den første uge, vand (kogt afkølet) gedemælk og flydende KMR - til nyfødte og i den første uge fortynd med 1/3 af hver, derefter mindre og mindre vand - måske også gedemælk, det vurderer man. Bedre end flydende KMR er flydende Just Born som indeholder colostrum - men den kan ikke købes i DK, så vidt jeg ved .

Som tommelfingerregel gives til killinger, der af årsager ikke får mælk fra deres mor:

1 ml erstatning pr. 30 gram killing ved hver fodring (ca. hver 2-3 time døgnet rundt i starten) indtil killingen vejer ca. 200 gram – så øges til 1,5 ml erstatning pr. 30 gram kropsvægt.

I starten vil killingen ikke være særlig samarbejdsvillig – men de lærer hurtigt hvor maden kommer fra. Der må IKKE overfodres - det giver diarre - og hellere lidt for tyndt end for kraftigt foder. Killingen fodres i samme stilling som når den dier – den skal stå på/have benene nedad

Det er forskelligt hvad man syntes er nemmest at fodre med. Nogen foretrækker en engangssprøjte (en dråbe af gangen i starten), andre en sutteflaske andre igen tube feeding = sondefodring - det kan ses her:

<http://pawpeds.com/pawacademy/reproduction/tubefeeding/>

Alt der kommer i killingen skal have kropstemperatur. Opvarm i vandbad og mærk temperaturen efter på indersiden af håndvristen. Det anbefales ikke at opvarme i microovn - den fordeler varmen forkert, så noget er gloende varmt og andet for koldt. Høj hygiejne med alt der bruges.

Kom ALDRIG mad på en killing der ikke har kropstemperatur. Er den kølig skal den varmes langsomt op først, det bedste sted at opvarme den er på din egen krop – det er perfekt at komme den ned i BH'en.

Det sker at killinger, af årsager af alt fra en dårlig eller syg mor, bakterier eller defekter ikke vil patte – det er som regel for sent at sætte ind med medicinsk behandling når du opdager det og har haft dyrlægen ind over. Det sker også der fødes killinger med ganespalte – en tilstand hvor det normalt er ganen der ikke er intakt – således er der ikke det korrekte undertryk når der pattes. Mælken vil så komme ud af næsen og/eller ryge i den gale hals – derfor ses ofte lungebetændelse. En sådan killing skal aflives. Lidelsen er arvelig – arvegangen kendes ikke. Diverse ”åbne deformiteter” menes at kunne forebygges med folinsyre

tilskud under hele drægtigheden.

ADVARSEL: Rå æggeblomme kan indeholde Salmonella, Honning kan give pølseforgiftning – begge dele dør killingerne af.

Temperaturer:

Normal endetarmstemperatur i en sund og levedygtig killing er:

1. uge 35 til 37.3 grader C
2. og 3. uge 36.1 til 37.7 grader C
4. uge = normaltemperatur 37.8 +/- 0.6 grader C

Hvis endetarmstemperaturen i en killing falder til under 34 grader C - er tilstanden yderst kritisk.

Killingen skal varmes langsomt op (tager 2 til 3 timer - gøres bedst på egen krop). For hurtigt opvarmning kan blive fatal.

Kropstemperaturen skal være normal FØR der kommes mad/væske på killingen ellers slår du den ihjel.

Killinger der er afkølet er ofte dehydreret - de skal have væske, helst electrolyte (diverse salte til at få balance) – druesukkervand kan bruges. Væske er efter opvarmning vigtigere at starte med end at fodre.

Temperatur for killinger (kassen de er i, ikke rummet)

- uge 1: 30-32 grader C
- uge 2: 27-29 grader C
- uge 3: 27 grader C
- uge 4: 24 grader C
- uge 5: 20 grader C

Temperaturen killingerne opholder sig i er vigtig da de ikke kan regulere varmen selv før de tidligst er fire uger. Er temperaturen for lav tager de mindre på.

Vægtøgning ca. 10 gram daglig – ca. fordobling af fødselsvægten den første uge

Killinger der ingen mor har skal til en amme iht lovgivningen

Er du ikke opdrætter - få steriliseret din hunkat så snart hendes killinger kan undvære hende - og vær opmærksom på at hun få uger efter fødsel kan komme i løbetid. Så er killinger uinteressante - hun vil hellere have tant og fjas.

Sørg for, INDEN killingerne fødes, ALT hvad der vil kunne blive brug for er i huset. Digitalt termometer med tynd fleksibel spids der måler temperaturen på 10 sekunder er uundværlig, ligeså er vægt med 1 grams interval

Og ingen killing er tjent med at håndfodres – den skal til ammemor og søskende for at blive en normal kat!!

Lis Dahlstrøm, juli 2017